
ノデアラウ。然シ、果シテ種ヲ形成スルカドウカハ、北村氏ト共ニ二ノ足ヲ踏マザルヲ得ナイト同時ニ、SAVATIER ノ採品ヲ再檢スルノ要ハアルガ今ノ所、種ト見テ整理スルノガ常識デアロウ。兎ニ角葉ノ形狀ガ、特ニ目立ツ樣デアル。(久内淸孝)

○たてやまぎくノ葉ニ三形アル

たてやまぎく (*Aster dimorphophyllus* FR. et SAV.) ハ Enum. Plant Japon. I, p. 225 デ公表サレタ新種デアルガ、其原記載ハ同書 II, p. 395-6 ニ始メテ現ハレテ居テ、其文ヲ一見スルニ、葉ノ個所デ Folia... ; caulina, inferiora et media ambitu cordato acuminata, basi profunde emarginata, nunc grosse et acute dentata, dentibus calloso mucronatis, nunc trilobata, lobis lateratlibus profunde biridis トアルカラ色々ノ形





狀ノ葉ノモノヲ綜合シテ記載シテ居ルモノト思ハレ、何レソンナ事カラ *dimorphophyllus* ナル種名モ出來タノデアラウ。其後、牧野先生ハ1911 年ニ植物學雜誌 XXV, p. 155 デ、之ヲ二ツノ變種ニ分ケラレタ卽チ、*Aster dimorphophyllus* FR. et SAV. var. *divisus* MAK. もみぢばたてやまぎく; var. *indivisa* MAK. たてやまぎくデアル。

サテ、上記ノモノハ學名デ分ル通リ、葉ノ分レタモノト分レナイモノトノ區別デアルカラ、之ヲ FR. et SAV. ノ言葉デ言フナラ lobis lateralibus profunde bifidis ト grosse et acute dentata ノ二ツニ當ルノデアラウ。然シ假令ソレガ小サナ事デアルニシテモ lateralibus profunde bifidis, 卽チ他ノ語デ表スナラ鳥趾形トモ言フベキモノト、acute dentata ト云フベキモノト、其中間ノモノトノ三形ノアル事ハ事實デアル。依テ其三形ノ寫眞ヲ示スコトニシタ。如何ニモ polymorph ナ葉ノ持主デアルカラ、遺傳學者デモ目ニツケナイトハ限ラナイ。(久内淸孝)